

Przygotowanie pacjenta do badania RM z dożylnym podaniem środka kontrastowego – dla wszystkich badań rezonansu magnetycznego z użyciem środka kontrastowego

1. Należy nie jeść i nie pić na 2 godz. przed planowanym badaniem
2. Osoby na stałe przyjmujące leki powinny zażyć je w zwykłych terminach (również pacjenci z cukrzycą typu I i II)
3. Należy spożywać dużo płynów (1,5-2l/dobę) w ciągu doby poprzedzającej badanie oraz jednej doby po badaniu
4. Należy zgłosić się z aktualnym wynikiem **stężenia kreatyniny** w surowicy krwi oraz wskaźnikiem eGFR (w przypadku braku, pielęgniarka ZDO dokonuje przeliczenia na podstawie danych pacjenta i poziomu kreatyniny) – **wynik ważny 3 miesiące**

WYJĄTEK: pacjenci z istniejącymi czynnikami ryzyka niewydolności nerek, takimi jak:

- znana choroba nerek
- poprzedni wynik eGFR <60 ml/min/1,73m²
- stan po operacji nerek
- wiek > 75 r.ż.
- przyjmowanie leków nefrotoksycznych (np. chemioterapia)

UWAGA: Jeśli występuje jeden z wymienionych czynników wówczas wynik stężenia kreatyniny w surowicy krwi ważny jest 2 tygodnie