



# **PRZYGOTOWANIE DO BADANIA**

## **Rezonans Magnetyczny prostaty z kontrastem**

### **Badanie powinno być wykonane:**

- min. 8 tyg. po biopsji prostaty – badanie wykonane za wcześnie może być niediagnostyczne

### **W dniu poprzedzającym badanie:**

- należy przyjmować leki odgazowujące zawierające symetykon np. Espumisan, Ulgix (dostępne bez recepty) lub podobne preparaty ziołowe - dawkowanie według ulotki dla Pacjenta dołączonej do preparatu

### **W dniu badania:**

- Pacjent zgłasza się na badanie po wypróżnieniu, można wziąć środek przeczyszczający (bez recepty), czopek lub zrobić lewatywę;
- należy przyjmować leki odgazowujące zawierające symetykon np. Espumisan, Ulgix (dostępne bez recepty) lub podobne preparaty ziołowe - dawkowanie według ulotki dla Pacjenta dołączonej do preparatu



### **Pacjent powinien przynieść na badanie:**

- wynik poziomu PSA
- jeśli Pacjent miał wykonywaną biopsję prostaty konieczne jest dostarczenie wyniku hist-pat (lokalizacja zmiany)

**TELEFON: (42) 271-15-75**