



PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Tomografii Komputerowej z kontrastem – ogólne wytyczne

Przed badaniem:

- należy wykonać badanie poziomu kreatyniny we krwi (badanie z krwi) i dostarczyć wynik w dniu badania do rejestracji (badanie jest ważne 3 miesiące, z wyjątkiem osób hospitalizowanych – 7 dni);
- 4-5 godzin przed badaniem nie przyjmować posiłków stałych (być na czczo);
- 2 godziny przed badaniem nie przyjmować płynów;
- zapisane na stałe leki wziąć w odpowiedniej dawce, popijając niewielką ilością płynu;

W dniu badania:

- należy stawić się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, w odpowiednim budynku, 15 minut przed wyznaczonym czasem badania. Podejść do rejestracji, aby dopełnić wszelkich formalności.

Jeżeli podobne badania TK/RM były wykonywane wcześniej, w innej placówce, prosimy o dostarczenie płyt oraz opisów tych badań.

! Pacjenci z NADCZYNNOSCIĄ tarczycy proszeni są o okazanie w dniu badania aktualnego poziomu TSH.

OSOBY CHORE NA CUKRZYCE, u których wynik eGFR < 60ml/ min/1,73m²

Osoby przyjmujące doustne leki przeciwcukrzycowe zawierające Metforminę muszą odstawić te leki na 48 godzin przed podaniem dożylnym środka kontrastowego stosowanego w diagnostyce TK i RM oraz 48 godzin po badaniu. Należy skonsultować się z prowadzącym lekarzem internistą lub diabetologiem w sprawie modyfikacji leczenia cukrzycy w czasie 4 dni (2 przed badaniem, 2 po badaniu), kiedy nie można przyjmować Metforminy.

Powyższa informacja nie dotyczy pacjentów leczonych Insuliną.